**Produkt:**

## COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei

1/6

**Gegen Birnengitterrost, Echten Mehltau, Schorf, Rost, Kräuselkrankheit, Blattflecken, Sternrußtau an Obst, Gemüse, Kräutern, Rosen und Zierpflanzen.**

## Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete:

| Anwendungsbereiche | Krankheiten |
|---|---|
| Zierpflanzen (Freiland und Gewächshaus) | Echter Mehltau |
| Rosen (Freiland) | Sternrußtau, |
| Apfel, Birne (Freiland) | Schorf |
| Apfel, Birne (Freiland) | Echter Mehltau |
| Birne (Freiland) | Birnengitterrost |
| Pfirsich, Aprikose, Nektarine (Freiland) | Kräuselkrankheit |
| Pflaume (Freiland) | Rost |
| Erdbeere (nach der Ernte; Freiland) | Weißfleckenkrankheit, Rotfleckenkrankheit |
| Himbeere (Freiland) | Rutensterben Himbeerrost[1] |
| Gurken, Zucchini (Gewächshaus), Gurken, Zucchini (Freiland) | Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheit, Stängelbrand |
| Spargel (Freiland) | Rost, Laubkrankheit |
| Rote Beete (Freiland) | Blattflecken (Cercospora und Ramularia) |
| Kohlrübe (Freiland) | Echter Mehltau, Pilzliche Blattflecken |
| Frische Kräuter (Freiland) | Echter Mehltau, Rost, Pilzliche Blattflecken |
| Möhre (Freiland) | Möhrenschwärze Schwarzfäule, Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheit (Cercospora carotae) (Blattbefall) |
| Knollensellerie, Bleichsellerie (Freiland), Porree (Freiland) | Blattfleckenkrankheit (Septoria -Arten) |
| Kopfkohl (Freiland; Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Kohlschwärze, Ringfleckenkrankheit |
| Rosenkohl (Freiland) | Echter Mehltau |
| Blumenkohl, Brokkoli (Freiland) | Kohlschwärze, Ringfleckenkrankheit |
| Pak Choi, Chinakohl (Freiland) | Kohlschwärze, Schwarzfäule, Ringfleckenkrankheit, Echter Mehltau |
| Pastinak (Freiland) | Echter Mehltau, Pilzliche Blattflecken |

[1] Diese Krankheit wird nach eigenen Erfahrungen bei Einsatz in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst.

**Produkt:** **COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei** 2/6

## Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete:

| Anwendungsbereiche | Krankheiten |
|---|---|
| Wurzelpetersilie (Freiland), Schwarzwurzel (Freiland), Meerrettich (Freiland) | Pilzliche Blattflecken, Echter Mehltau |
| Speisezwiebel (Freiland; Nutzung als Trockenzwiebel) | Purpurfleckenkrankheit |

## Produkteigenschaften:

- Wirkt schützend und heilend
- Stoppt die Ausbreitung in bereits befallenen Blättern und schützt vor Neubefall
- Lang anhaltende Wirkung durch Depoteffekt
- Mit COMPO Axoris® Spritz- und Gießmittel mischbar
- Wirtschaftlich: 150 ml für 500 $m^2$

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Produkt-Typ: | Fungizid |
| Wirkstoff: | 16,7 g/l Difenoconazol |
| Gefahrstoffkennzeichnung: | keine |
| Zulassungsnummer: | 006300-60 |
| Packungsgröße: | 75 ml und 150 ml Dosierflasche |

## Anwendung

**Anwendung im Haus- und Kleingarten zulässig!**

Handelsübliche Gartenspritze verwenden und möglichst auch die Blattunterseiten behandeln. Immer frühzeitig, nur in der vollen, zugelassenen Konzentration und nicht zu oft spritzen. Vor Gebrauch gut schütteln. Zur Dosierung beiliegenden Messbecher verwenden.

Konzentrat, wie in der folgenden Tabelle beschrieben, in Wasser geben und gut durchmischen.
Die Pflanzen von allen Seiten gleichmäßig einsprühen. Immer nur soviel Spritzbrühe ansetzten, wie an einem Tag benötigt wird. Reste der Spritzbrühe nicht aufbewahren sondern
1:10 mit Wasser verdünnen und auf den behandelten Kulturen ausbringen.
**Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.**

**Produkt:** **COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei** 3/6

## Anwendung

| Krankheiten | Anwendungsbereich | Anwendungsmenge<br>Maximale Anzahl der Anwendungen | Wartezeiten |
|---|---|---|---|
| Zierpflanzen (Freiland und Gewächshaus) | Echter Mehltau | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 8 – 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | |
| Rosen (Freiland) | Sternrußtau | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 8 – 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | |
| Apfel, Birne (Freiland) | Schorf | 3 ml in 1 ltr Wasser für 27 $m^2$ und je Meter Kronenhöhe. Ab Erscheinen der Blattspitzen bis ca. 3 cm Fruchtdurchmesser in Abständen von 10 – 20 Tagen wiederholt spritzen, sofern die Blätter länger als 9 Stunden feucht waren; max. 4 Anwendungen | 28 Tage |
| Apfel, Birne (Freiland) | Echter Mehltau | 3 ml in 1 ltr Wasser für 27 $m^2$ und je Meter Kronenhöhe in Abständen von 10 – 14 Tagen; max. 4 Anwendungen | 28 Tage |
| Birne (Freiland) | Birnengitterrost | 3 ml in 1 ltr Wasser für 27 $m^2$ und je Meter Kronenhöhe, ab Entfaltung der ersten Laubblätter bis zu 4 Behandlungen in Abständen von 10 – 14 Tagen; max. 4 Anwendungen | 28 Tage |
| Pfirsich, Aprikose, Nektarine (Freiland) | Kräuselkrankheit | 3 ml in 1 ltr Wasser für 27 $m^2$ und je Meter Kronenhöhe, vor Austrieb bei beginnendem Knospenschwellen (ca. Ende Februar/Anfang März) bis zum Erscheinen der grünen Spitzen der Blattknospen wiederholt spritzen; max. 3 Anwendungen | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt |
| Pflaume (Freiland) | Rost | 3 ml in 1 ltr Wasser für 27 $m^2$ und je Meter Kronenhöhe(etwa Ende Juli) 2-3 Spritzungen in Abständen von 10 – 14 Tagen. Frühpflaumen erst nach der Ernte behandeln; max. 3 Anwendungen | 30 Tage |
| Erdbeere (nach der Ernte Freiland) | Weißfleckenkrankheit, Rotfleckenkrankheit | 12 ml in 2 ltr Wasser für 20 $m^2$; Reihenbehandlung in Abständen von 7 – 14 Tagen; max. 2 Anwendungen | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt |

**Produkt:** **COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei** 4/6

## Anwendung

| Krankheiten | Anwendungsbereich | Anwendungsmenge<br>Maximale Anzahl der Anwendungen | Wartezeiten |
|---|---|---|---|
| Himbeere (Freiland) | Rutensterben<br>Himbeerrost[1] | 12 ml in 2 ltr Wasser für 20 m², Nach der Ernte in Abständen von 7 – 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt |
| Gurken, Zucchini (Gewächshaus), Gurken, Zucchini (Freiland) | Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheit, Stängelbrand | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 10 – 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | 3 Tage |
| Spargel (Freiland) | Rost, Laubkrankheit | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 14 - 21 Tagen; max. 3 Anwendungen | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt |
| Rote Beete (Freiland) | Blattflecken (Cercospora und Ramularia) | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 10 - 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | 28 Tage |
| Kohlrübe (Freiland) | Echter Mehltau, Pilzliche Blattflecken | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 10 - 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | 28 Tage |
| Frische Kräuter (Freiland) | Echter Mehltau, Rost, Pilzliche Blattflecken | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 10 - 14 Tagen; max. 2 Anwendungen | 14 Tage |
| Möhre (Freiland) | Möhrenschwärze Schwarzfäule, Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheit (Cercospora carotae) (Blattbefall) | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 14 - 21 Tagen; max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Knollensellerie, Bleichsellerie (Freiland) | Blattfleckenkrankheit (Septoria -Arten) | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 10 - 14 Tagen; max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Kopfkohl (Freiland; Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Kohlschwärze, Ringfleckenkrankheit | 10 ml in 1 ltr Wasser in Abständen von 14 - 21 Tagen; max. 3 Anwendungen | 21 Tage |

[1] Diese Krankheit wird nach eigenen Erfahrungen bei Einsatz in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst.

**Produkt:** **COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei** 5/6

## Anwendung

| Krankheiten | Anwendungsbereich | Anwendungsmenge<br>Maximale Anzahl der Anwendungen | Wartezeiten |
|---|---|---|---|
| Rosenkohl (Freiland) | Echter Mehltau | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 14 - 21 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Blumenkohl, Brokkoli (Freiland) | Kohlschwärze, Ringfleckenkrankheit | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 14 - 21 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Pak Choi, Chinakohl (Freiland) | Kohlschwärze, Schwarzfäule, Ringfleckenkrankheit, Echter Mehltau | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 10 - 14 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Pastinak (Freiland) | Echter Mehltau, Pilzliche Blattflecken | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 14 - 21 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Wurzelpetersilie (Freiland), Schwarzwurzel (Freiland), Meerrettich (Freiland) | Pilzliche Blattflecken, Echter Mehltau | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 14 - 21 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 14 Tage |
| Porree (Freiland) | Blattfleckenkrankheit (Septoria -Arten) | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 10 - 14 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 21 Tage |
| Speisezwiebel (Freiland; Nutzung als Trockenzwiebel) | Purpurflecken-krankheit | 10 ml in 1 ltr Wasser<br>in Abständen von 7 - 14 Tagen;<br>max. 3 Anwendungen | 21 Tage |

**Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe:**
Bei Gemüse und Kräuter im Freiland:

| | | |
|---|---|---|
| Pflanzenhöhe: | Bis 50 cm | 600 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |

Bei Gurken im Gewächshaus:

| | | |
|---|---|---|
| Pflanzenhöhe: | Bis 50 cm | 600 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |
| | 50 bis 125 cm | 900 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |
| | über 125 cm | 1200 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |

**Produkt:** **COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei** 6/6

## Anwendung

**Rosen und andere Zierpflanzen im Freiland und Gewächshaus:**

| | | |
|---|---|---|
| Pflanzenhöhe: | Bis 50 cm | 450 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |
| | 50 bis 125 cm | 600 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |
| | über 125 cm | 750 ml Spritzbrühe pro 10 $m^2$ |

**Anwendungszeitraum:**
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.

| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**Verträglichkeit:**
Duaxo® Universal Pilz-frei ist sehr gut pflanzenverträglich. Empfindliche Pflanzenarten oder –sorten sind nicht bekannt. An heißen Tagen nur in den Abendstunden anwenden. Da es große Sortenunterschiede geben kann, ist vor der Behandlung größerer Bestände oder wertvoller Einzelpflanzen die Verträglichkeit an einigen Blüten und Blättern zu testen. Beobachtungszeit 10 Tage.

## Hinweise

**Diese Produktinformation ersetzt nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung.**